

Čebelarstva zveza Slovenije
Javna svetovalna služba v čebelarstvu

E-svetovalec

JULIJ 2025

TEHNOLOGIJA ČEBELARJENJA:

Leto se je prelomilo in že je tu mesec julij. Glavna sprememba v tem mesecu pri čebeljih družinah je ta, da so dosegle svoj končni obseg.

Naša skrb v tem mesecu mora biti, da čim dalj časa zadržimo sedANJI obseg gnezda. V kolikor ni v naravi nobene redne paše, je pomoč čebelarja je v drugi polovici meseca nujno potrebna. Ker po kostanju do cvetenja otave in slučajnega medenja hoje nastane brezpašna doba, obstaja nevarnost, da bi začele matice prenehati zalegati. Pomoč čebelarja naj bo v tem, da se zopet povrne k sladkorju, kot nadomestku ali dopolnilu skromne naravne paše. S sladkorjem vsaj delno obdržimo raven zaleganja iz kostanjeve paše in s tem vplivamo na številčno moč družin ob zazimljenju.

Kako krmiti družine v tem brezpašnem obdobju, si lahko preberete in ogledate v povezavah:

http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/9450

<https://vimeo.com/user104873822>

V tem najtoplejšem mesecu ne smemo pozabiti na oskrbo čebel z čisto neoporečno vodo. To je namreč najpomembnejši temeljni pogoj, da čebele lahko nadzirajo temperaturo v panju in da je zalegi omogočen normalen razvoj. Z vodo in trepetanjem z krili čebele hladijo notranjost panja.


http://www.czs.si/Admin/load.php?sif_ob=5&sif_file=objave_podrobno_czs&sif_parent=7578

<https://vimeo.com/user104873822>

Kako napraviti dober napajalnik si preberite v povezavi :

<http://www.czs.si/Files/Slovenski%20cebelar%205-2010.pdf>

V tem mesecu je čas, da stare matice zamenjamo z novimi. Zamenjava matic spada med važnejša opravila v čebelarstvu. Matice obilno zalegajo le prvo in drugo leto, tretje leto pa je njihova rodovitnost običajno že manjša. Tako moramo določeno število matic menjati vsako leto, ker le tako v znatni meri lahko vplivamo na uspeh čebelarjenja. Kako uspešno dodati novo matico si preberite in ogledate v povezavi:



Čebelarstva zveza Slovenije
Javna svetovalna služba v čebelarstvu

E-svetovalec

http://www.czs.si/Files/SlovCebelar_05-2008.pdf

<https://vimeo.com/user104873822>

V kolikor pride do pojava ropa, je navadno čebelar povzročitelj tega. Vzrokov je lahko več: od razlitja sladkorne tekočine do nepotrebnega brskanja po čebelji družini. Ob nastanku ropa je potrebno takoj končati vsako delo pri čebelah, močnejšim družinam pripriti žrela, slabše družine pa prepeljati na rezervno stojišče.

Kako preprečimo rop so preberite v povezavi:

http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/9454

V juliju pa ne smemo pozabiti na glavno opravilo v tem mesecu to je zatiranje varoj. Vse potrebne informacije in navodila glede tega lahko dobite na spletni strani VF-NVI :

<http://www.vf.uni-lj.si/si/zdravstveno-varstvo-cebel/>

VARNA HRANA:

V kolikor točite med poskrbite za ustrezne higiensko tehnične pogoje za delo in tudi za to, da je med, ki ga točimo zrel.

Med je zrel, ko vsebuje manj kot 20 % vode, še bolje je, da vsebuje manj vode. Med iz sistema višje kakovosti ne sme vsebovati več kot 18,6 % vode. Če nismo prepričani, ali je med zrel, izmerimo vsebnost vode z refraktometrom ali pokličimo terenskega svetovalca.

Čebelarjem svetujemo, da pri točenju upoštevajo Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu

<http://www.czs.si/content/X3>

Več o točenju medu si lahko preberete v povezavi:

<http://www.czs.si/Files/Slovenski%20cebelar%205-2010.pdf>